

# Cebe-S

Citrate de bismuth colloïdal 120 mg Tab.

LA

## nouvelle voie pour traiter complètement et radicalement les ulcères brûlants

**En monothérapie.**  
**En combinaison avec IPP.**  
**En combinaison avec anti - H<sub>2</sub>**

**Cebe-S** fait pencher la balance vers la guérison

### Facteurs Agressifs:

- Acidité gastrique
- Infections à *Helicobacter Pylori*
- Pepsine - sucs biliaires et pancréatiques
- Anxiété
- Divers

**Cebe-S**<sup>®</sup>

- ✓ Procure un soulagement immédiat de l'ulcère par la formation d'un précipité adhérent à l'ulcération gastrique
- ✓ augmente les facteurs défensifs :
  - ↑ La sécrétion de bicarbonates
  - ↑ La sécrétion de mucus
  - ↑ Le flux sanguin des muqueuses
  - ↑ Régénération épithéliale
- ✓ Possède un effet bactéricide par *helicobacter pylori*

Guérison de l'ulcère

Ulcère gastro-duodénal

À prendre  
une demi-heure  
avant le repas



### Informations thérapeutiques

**COMPOSITION:** Chaque comprimé contient: Citrate de bismuth colloïdal équivalent à du trioxyde de bismuth (Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ..... 120 mg.

**INDICATIONS:** les ulcères gastriques et les dyspepsies digestives.

**DOSAGE ET MODE D'EMPLOI :** Deux comprimés deux fois par jour une demi-heure avant le petit déjeuner et le dîner, ou un comprimé quatre fois par jour, une demi-heure avant les trois principaux repas et au coucher. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. CEBE-S devrait être pris pendant 4 à 8 semaines. Ensuite, il faut observer une fenêtre d'interruption de 8 semaines. Si nécessaire un nouveau protocole de traitement peut être prescrit pour 4 à 8 semaines après la fenêtre d'interruption. Il faut orienter le malade vers un service spécialisé si ces deux protocoles ne sont pas suffisants.

**EFFETS SECONDAIRES :** Les doses utilisées ; la durée du traitement et la fenêtre d'interruption thérapeutique font que l'on n'observe pas d'encéphalopathies ni d'autres symptômes d'intoxication bismuthiques.

Le noircissement des selles est possible par la formation de sulfure de bismuth. Nausées et vomissement peuvent également survenir. Ces effets ne sont pas dangereux et disparaissent à la fin des prises du produit.

**CONTRE-INDICATIONS :** Dysfonction rénale sévère.

**AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS :**

L'utilisation prolongée des doses élevées de composés de bismuth est déconseillé. L'utilisation concomitante de CEBE-S et un autre composé de bismuth devrait être évitée. la posologie recommandée doit être respectée.

**L'UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET ALLAITEMENT:** L'utilisation de CEBE-S est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement sauf sur recommandation et contrôle médicale.

**INTERACTIONS:**

Les antiacides et le lait ne doivent pas être pris une demi-heure avant et une demi-heure après la prise de CEBE-S. En effet l'acidité gastrique est nécessaire pour la formation de la couche protectrice issue du précipité du citrate de bismuth dans l'estomac

**CONSERVATION**

CEBE-S doit être conservé à sec en dessous de 30° C jusqu'à la date limite de péremption mentionnée sur l'emballage

**CONDITIONNEMENT:**  
Boîte de 2 x 10 comprimés.

**adamjee**  
Pharmaceuticals

Adamjee Pharmaceuticals (Pvt) Ltd.  
Terrain 39, Secteur 15, K.I.A; Karachi au Pakistan

### References:

1. Konturek 1987; Rask-Madsen 1988
2. F. Cipoline et al Brit. J. Clin. pract. Vol 41:4(1987)
3. Miller et al. Sland J. Gastro 1981, 24(Suppl. 160) 39 45
4. Lambert JR Scand J. Gastro 1991, 26 (Suppl. 1985), 13-21
5. Hosking SW et al Duodenal Ulcer healing by eradication of *Helicobacter Pylori* without anti-acid treatment: randomised Controlled trial, Lancet 1994; 343:506-10