



**RENYL** est indiquée pour les patients avec :

- **Hyperkaliémie associée ou non à une oligurie ou à une anurie**
- **Hyperkaliémie à tous les stades d'évolution provoquée par une insuffisance rénale aiguë ou chronique**
- **Dyalyses fréquentes**

**Il est conseillé de donner **RENYL** pour contrôler l'hyperkaliémie pendant les dialyses**

1.JASN ( Journal Of American Society of Nephrology)

JASN December 2017 28: 3441-3451; published ahead of print October 9, 2017, doi:10.1681/ASN.2017060640

2.Papadimitriou M, Gingell JC, Chisholm GD. Hypercalcaemia from calcium ion-exchange resin in patients on regular haemodialysis. Lancet 1968;2:948-50.

### Posologie :

- \* Kallienne supérieure à 5mmol/l
  - Adulte : 15g de poudre 1 à 3 fois / jour
  - Enfant : 0,5 à 1,0 g de poudre par Kg de poids corporel - 1 à 3 fois / jour
- \* Arrêter les prises si la Kallienne descend en dessous de 5mmol/l
- \* La poudre doit être mélangée à environ 150ml de liquide avant les prises.



**Renyl**  
Poudre  
La Dialyse sans peur

[www.austerepharma.in](http://www.austerepharma.in)